



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

Iktatószám: JN-07/55/00922-14/2018.

Tárgy: Károsító helyzet-jelentés

Melléklet: -

Ügyintéző: Vincze Katalin

Telefon: 20/434-7679

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

2018. 10. 01. - 2018. 10. 15. között

Időjárás: Október első dekádjának időjárása nem hozott változást az előző hónaphoz képest. Beköszöntött a vénasszonyok nyara. A nappali középhőmérséklet 20-22 °C-ok közül alakult. Az esti órákban jelentős a lehűlés. A dekád végén a reggeli órákban kisebb mértékű kisugárzási köd létrejött volt tapasztalható. A tavasziasan meleg napokat zápor, zivatar nem zavarta meg. A szárazság egyre komolyabb problémát jelent. A vetések kelése vontatott, a kikelt állományok vízhiányban szenvednek, nehéz megfelelő talajmunkát végezni.

Fenológiai állapotok (10. 01. - 10. 15.):

- **Őszi kalászosok:** vetés – csírázás
- **Kukorica:** betakarítás vége
- **Napraforgó:** tarlóápolás
- **Őszi káposztarepce:** 4 leveles állapot – tőlevélrózsás állapot
- **Lucerna:** 20 cm növendék
- **Szőlő:** szüretelés vége
- **Gyümölcsösök:** betakarítás utáni állapot – levélhullás

Károsítóhelyzet:

- **Őszi káposztarepce:** A megye északi részén (pl.: Jászság) a repce állományok igen jól fejlettek, szép, egyöntetű állományok jöttek létre. Ezeket az állományokat elkezdték regulátorozni. Ezzel ellentétben a megye déli részén sok a ritka, fejlettségükben heterogén állomány. A megye egészére elmondható, hogy a vízhiány óriási, a repce fejlődése leállt. Az aszályos időjárás következtében a fiatal növényeket szinte a reggeli harmatképződés tartja életben.

Károsítók tekintetében a repcedarázs - *Athalia rosea* rajzása befejeződött. Több helyen kétszeri védekezésre is szükség volt a károsító ellen. Az állományokban ugyanakkor megkezdődött a mezei pocok - *Microtus arvalis* betelepülése. A megye déli részén jellemző főleg a felszaporodó egyedszám. Az elmúlt hónapoz képest növekedett a lakott járatok száma, jelenleg 5-6 lakott járat/100 m², és már nem csak ruderaliákon, tarlókon, lucerna állományokban lehet megtalálni a járatokat, hanem repce állományokban is. A megye északi részén (Jászság) egyelőre nem tapasztalható létszámnövekedés.

- **Őszi kalászosok:** A legtöbb helyen zajlik az őszi kalászosok vetése. Az állományok java része már a földben van, de a kelés igen vontatott. Óriási a vízhiány a területeken, a poros magágyba vetett magok nem tudnak csírázásba indulni.
- **Lucerna:** A lucerna állományok változóan vagy kaszálás előtt vagy utáni fenológiában találhatók. A megye déli részén a lucerna állományokban is megnövekedett a Mezei pocok - *Microtus arvalis* egyedszáma, és megfigyelhető az állományokból történő kivándorlás a repce és gabona táblák felé.
- **Kukorica:** A kukorica aratása szinte mindenhol befejeződött. A termésmennyiségek a várakozáson felül alakultak. A nedvességtartalmak szinte mindenhol 14% alatti volt, így a tételek szárítására nem volt szükség. Az állományokban alacsony volt a különböző penészgombák (pl. *Fusarium* spp.) fertőzése. A fennmaradó tarlók tarlóápolása megkezdődött és javában tart, de igen nehéz a száraz talajban megfelelő tarlómunkát végezni.

- **Napraforgó:** A szárzúzás és a tarlóápolási munkálatok folyamatosan zajlanak. A talajok kiszáradása miatt a legtöbb termelő, (főleg a kötöttebb területeken) a szántásról áttért a talajok lazításra, nehéz tárcsák alkalmazására.

Szolnok, 2018. október 15.



Polgár Viktória
osztályvezető

